

Карта медицинской профилактики социально значимых заболеваний в России

ВИЧ-инфекция и СПИД

Что нужно знать о ВИЧ/СПИД?

ВИЧ-инфекция — хроническое инфекционное заболевание, вызываемое Вирусом Иммунодефицита Человека (ВИЧ), характеризуется прогрессирующим поражением иммунной системы.


СПИД — синдром приобретенного иммунодефицита, терминальная (последняя) стадия развития ВИЧ-инфекции. Развивается у тех, кто не принимает антиретровирусных препаратов.



**ВИЧ-инфекция —
это еще не СПИД.**

Субъекты с максимальным значением показателя заболеваемости

За 1 час ВИЧ поражает 10 человек в России.
Число россиян, инфицированных ВИЧ, более 900 000.



ВИЧ передается



Через кровь

Переливание ВИЧ-инфицированной крови, небезопасные инъекции, нестерильные разрезы или прокалывание; совместное пользование иглами, шприцами



Половым путем

Любой сексуальный контакт без применения средств контрацепции (презерватива), а также при их неправильном применении.



От матери к ребенку


Во время беременности, родов или грудного вскармливания.

Применение высокоэффективной антиретровирусной профилактики позволяет ВИЧ-положительным матерям рожать здоровых детей.

ВИЧ не передается, когда Вы



Обнимаете друг друга,
пожимаете руки, целуете



Пользуетесь общей
посудой, одеждой, бельем
и бытовыми предметами



Посещаете бассейн, душевую,
ходите в сауну и туалет



Кашляете, чихаете.
ВИЧ не передается
через слезы и пот.



Распространенные мифы о ВИЧ

МИФ 1


**Я не наркоман, потому
не вхожу в группу риска.
ВИЧ мне не грозит**

Многие женщины заразились ВИЧ от своего первого полового партнера, а о том, что они являются носительницами вируса, узнали во время беременности или при подготовке к ней. Мужчины, который их заразили, могли вести в молодости беспорядочную половую жизнь или же пробовали инъекционные наркотики.

МИФ 2

ВИЧ можно заразиться где угодно — в общественном туалете, вагоне метро или на общей кухне в офисе

Заразиться ВИЧ в быту практически невозможно: вне человеческого тела вирус погибает. Нельзя подхватить вирус при посещении бассейна или сауны, а также заразиться после укуса комара. Кроме того, заражение происходит при непосредственном введении вируса в кровоток.



МИФ 3

Заражение ВИЧ — смертельный приговор

Нет. Инфицирование вирусом иммунодефицита человека вовсе не означает скорую смерть.

При своевременно начатом лечении и соблюдении режима приема антиретровирусных препаратов, ВИЧ-положительные пациенты имеют все шансы на долгую и активную жизнь.

МИФ 4


Если у человека ВИЧ, то он болен СПИДом

ВИЧ и СПИД — не синонимы. Получение положительного результата анализа на ВИЧ свидетельствует только об одном — вы являетесь носителем вируса иммунодефицита человека. СПИД — синдром приобретенного иммунодефицита — поздняя стадия ВИЧ-инфекции, которая развивается далеко не у всех больных.

МИФ 5

У ВИЧ-положительной женщины обязательно родится ребенок, инфицированный ВИЧ. Такой ребенок опасен для окружающих и посещать детский сад он не должен

Риск рождения ВИЧ-положительного ребенка от ВИЧ-инфицированной матери меньше 50% — это справедливо в тех случаях, если женщина не получает никакого лечения. Антиретровирусная терапия сводит к минимуму риск передачи вируса от инфицированной матери ребенку.



ВИЧ-инфекция НЕ приговор!

Полностью избавить организм от вируса невозможно,
но постоянный прием АРВТ (АнтиРетровируснойТерапии):



Позволяет снизить
вирусную нагрузку
(количество вируса)
и вероятность его
передачи другим лицам



Следуя рекомендациям врача,
человек живёт полноценной
жизнью до глубокой старости



Постоянный ежедневный
прием АРВТ замедляет
развитие ВИЧ-инфекции
и предотвращает переход
в стадию СПИД



Предоставляется
гражданам России
бесплатно

Узнай свой ВИЧ-статус

Знать свой ВИЧ-статус – это так же естественно, как знать о других своих хронических болезнях.

КАК?

Бесплатно сдай кровь, проконсультируйся со специалистом. Ты это можешь сделать анонимно. Также существуют экспресс-тесты (например, по слюне).

ГДЕ?

В любом учреждении здравоохранения по месту жительства, в кабинетах анонимного и добровольного тестирования, в региональном Центре профилактики и борьбы со СПИДом.

КОГДА?

Если есть риск заражения ВИЧ-инфекцией. Необходимо пройти или повторить тестирование через 3 месяца после вероятного заражения.

Важно! Желательно знать свой ВИЧ-статус всегда. Регулярно проходить тестирование.

**Сегодня ВИЧ-инфекция –
контролируемое заболевание
твоя защита – предупредить ВИЧ**

Узнай больше:

стопвичспид.рф

www.волонтеры-медики.рф

o-spide.ru